

Principali differenze tra "castagno" e "marone" in *Castanea sativa*.

Caratteri	CASTAGNO	MARONE
Vigoria:	Da scarsa a molto elevata	Medio - elevata
Portamento:	Da assurgente a regolare o espanso	Regolare
Fertilità:	Medio - elevata	Medio - scarsa
Polline/amento:	Da elevato a molto elevato	Da medio ad assente
Androsterilità:	In genere assente	In genere presente
Autoincompatibilità:	In genere assente	In genere presente
Produttività:	Elevata e costante	Incostante
Resistenza al cancro:	Media	Medio - scarsa
Resistenza agli insetti:	Poco suscettibile	Mediamente suscettibile
Pezzatura:	Da molto piccola a molto grossa (tendenzialmente più di 90 frutti per 1 Kg)	Da media a molto grossa (tendenzialmente meno di 90 frutti per 1 Kg)
Forma:	Molto variabile, semisferica, allungata longitudinalmente o quasi conica,	Molto omogenea, sempre allungata trasversalmente o ovale - allargata.
Pericarpo (buccia)	Spesso e coriaceo, di colore marrone scuro uniforme.	Sottile, di colore marrone chiaro, con striature più scure in senso meridiano, ben marcate.
Episperma (pellicola):	Spesso e profondamente inserito nel seme.	Sottile, facilmente asportabile e raramente inserito nel seme.
Cicatrice ilare:	Espansa ed ellittica.	Ridotta e rettangolare.
Sapore polpa:	Da poco dolce a molto dolce, talvolta astringente.	Dolce o molto dolce.
Settatura (poliembrionia)	Molto variabile.	Da scarsa a mediamente presente.
Frutti/riccio:	1 - 7	1 - 3